



— Quels sont les signes à observer ?

En cas d'apparition d'un des symptômes suivants, contactez l'équipe soignante.


- Au niveau de votre bras si :
- il est enflé ou plus gros que le bras opposé, ou plus dur que d'habitude, il vous semble plus chaud localement, vous éprouvez une nouvelle douleur au niveau du bras ou de l'épaule, vous ressentez une perte de sensibilité au niveau de la main.
 - Au niveau du cathéter, si apparaît une rougeur au point d'insertion, un écoulement de sang ou autre liquide.
 - Au niveau général, avec l'apparition d'une fièvre (> 38°) avec ou sans frissons, toux anormale ou un essoufflement, douleur lors de l'injection du médicament.

INFORMATION IMPORTANTE
Si le MID/PICC Line est bouché et les tentatives de désobstruction par les infirmier-ères ont échoué, le/la médecin peut décider de retirer le cathéter, de même en cas d'infection.

— Quand et comment est retiré le MID/PICC Line ?

Le/la médecin décide de retirer le MID/PICC Line lorsque le traitement est terminé ou lorsque le dispositif est infecté ou non fonctionnel.

Le retrait du PICC Line est réalisé à l'hôpital en ambulatoire par un-e infirmier-ère : il/elle retire le dispositif et effectue une légère pression localement au niveau du point d'insertion. Ce geste ne nécessite aucune anesthésie locale, car il est indolore. Un pansement est posé jusqu'à cicatrisation complète.



Contact

Équipe soignante
03 21 54 90 53



Polyclinique de la Clarence
Groupe AHNAC
Rue du Docteur Charles Legay
62460 DIVION
03 21 54 90 00



Chaque jour, prendre soin de la santé de chacun

Polyclinique de la Clarence

Divion



POSE DE VOIE VEINEUSE

Périphérique avec le système MID Line
Centrale par insertion périphérique : PICC Line

[Informations / Conseils](#)



Chaque jour, prendre soin de la santé de chacun

Audace 03 21 35 000

— Qu'est-ce qu'un MID/PICC Line ?

Il s'agit de deux dispositifs d'accès veineux posés au niveau du bras au niveau périphérique.

■ **Le MID Line** est un accès veineux périphérique, les règles de perfusion sont les mêmes qu'une voie veineuse périphérique. Il peut être laissé en place 30 jours.

■ **Le PICC Line** est un cathéter veineux central posé par voie périphérique.

Ces deux dispositifs sont des cathéters en matière synthétique, long et souple.

Le cathéter est inséré au-dessus du pli du coude dans une veine du bras et arrive dans une veine de plus gros calibre à la racine du bras (MID line) ou à l'entrée du coeur (PICC Line).

Il peut rester en place plusieurs semaines (Midline), voire quelques mois (PICC Line), cela dépend du traitement et de votre état de santé.

Il est équipé à son extrémité d'un embout appelé valve anti-reflux qui permet de le fermer en cas de non utilisation.

— Pourquoi un MID/PICC Line ?

Ce cathéter permet :


- les injections et les perfusions des médicaments
- les transfusions
- la réalisation de prélèvements sanguins
- une alimentation par la veine

Il se retire aisément et sans douleur à la fin du traitement sur prescription médicale.

Il vous est proposé car :

- votre état de santé nécessite l'administration de médicaments pendant plusieurs semaines voire quelques mois ;
- les veines de vos mains et vos bras sont fragiles et ne permettent pas des ponctions fréquentes ;
- les médicaments prescrits peuvent irriter ou endommager les petites veines de la main ou du bras.

— Comment se pose un MID/PICC Line ?



Ce type de cathéter est posé par un médecin ou un Infirmier spécialisé et formé à la pose.

La pose se fait au bloc opératoire dans un environnement stérile. Il n'est pas nécessaire d'être à jeun pour la pose, et le geste se fait en ambulatoire. Le cathéter se pose à la face interne du bras sous contrôle échographique. Il est ensuite fixé avec un système stabilisant et recouvert d'un pansement transparent, vous pourrez plier votre bras sans problème. La durée de la pose va de 15 à 45 minutes. Dans le cadre d'un PICC Line, une radiographie du thorax est parfois demandée.

— Précautions pour le pansement

Le MID/PICC Line doit être impérativement protégé par un pansement hermétique et stérile. Celui-ci permet la respiration cutanée et protège le point d'insertion contre d'éventuelles contaminations bactériennes.

Grâce à ce pansement transparent, la surveillance visuelle du cathéter est optimale.

Le pansement doit être refait par le personnel infirmier qualifié, à domicile ou en ambulatoire, 24 à 48 heures après la pose, puis tous les 7 jours.

Le renouvellement hebdomadaire du pansement comprend la désinfection de la peau, le changement du système de fixation spécifique de ce cathéter et du pansement transparent. Si le pansement est décollé, humide ou souillé, renoncez à le changer tout seul car vous risquez de retirer accidentellement le cathéter ; prenez contact avec l'équipe soignante.

— Précautions à la maison

L'Entretien de votre MID/PICC Line

Toutes les manipulations (pansement, valve, prélèvement, injection) sont effectuées par des soignant-es. Ils appliquent les recommandations décrites sur le carnet de suivi que l'équipe vous remet lors de la pose.

En dehors des soins, si le MID/PICC Line est équipé d'un clamp, ce dernier doit toujours être ouvert.

L'extrémité du cathéter doit toujours être fermée par une valve anti-reflux protégée par une compresse, tenue par un filet pour éviter le balancement au niveau du coude.

INFORMATION IMPORTANTE

Pour éviter toute infection, lavez-vous soigneusement et souvent les mains : après être allé aux toilettes, après un contact avec la nourriture, si vous toussiez, si vous éternuez ou après une visite à une personne malade.
De manière générale, évitez de toucher votre MID/PICC Line ou le pansement transparent.

L'Activité au quotidien

Bougez votre bras normalement pour favoriser la circulation sanguine. Il est recommandé de ne pas soulever des charges lourdes ou d'effectuer des mouvements répétitifs exigeant de plier le bras. Les sports violents sont déconseillés.

Hygiène personnelle

La douche est possible, mais avec des précautions pour éviter de mouiller le pansement et de le décoller. Des protections existent, parlez-en à l'infirmière. Si vous préférez prendre un bain, n'immergez pas le bras dans l'eau. Aucun vêtement n'est contre-indiqué, cependant, évitez les manches trop serrées qui peuvent créer une compression locale. **Une attention toute particulière doit être prise lors du déshabillage pour éviter de tirer accidentellement sur le cathéter.**



ATTENTION

Si vous observez du sang au niveau du pansement qui recouvre le bout du cathéter ou si le pansement est mouillé, clamez le cathéter comme cela vous a été enseigné, et contactez rapidement l'équipe soignante.

— Que faire en cas de retrait accidentel du MID/ PICC Line ?

Cela peut parfois arriver. Gardez votre calme et regardez si le MID/PICC Line est complètement ou partiellement sorti de la veine. Si le MID/PICC Line est partiellement sorti : maintenez-le en place et entourez-le avec un bandage propre autour du bras.

Si le MID/PICC Line est complètement sorti : effectuez une pression de quelques minutes avec votre main et une compresse au niveau du point d'insertion pour limiter le saignement, puis posez un pansement que vous serrez légèrement.

Dans tous les cas, prenez immédiatement contact avec l'équipe soignante ou le service des urgences de l'hôpital le plus proche de chez vous